

## Anwendungsvorschlag Biolchim Biostimulanzen

Gattung	Betrieb	Bereich	gießen vor dem Topfen / nach stecken, säen	Kulturwochen / Kulturabschnitte 1 - 10 (weitere entsprechend weiterführen)									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Primula vulgaris, Viola, Myosotis, Stauden	Bluzie	Kultur	MiCo 0,25% Nova 0,25%	Phosfik 0,25% gießen	Begreen 0,25% Phosfik 0,25% Ligoplex Ca 0,2%	Begreen 0,25 Loker SA 0,25%	BetaB 0,25% Shift 0,15% Ligoplex Ca 0,2%	Fylloton 0,25% Microfol 0,05%	Begreen 0,25% Phosfik 0,25% Ligoplex Ca 0,2%	Loker SA 0,25% Shift 0,15%	BetaB 0,25% Phosfik 0,25% Ligoplex Ca 0,2%	Fylloton 0,25% Microfol 0,05%	Begreen 0,25% Phosfik 0,25% Ligoplex Ca 0,2%
										Diesen Block bis Kulturende wiederholen und vor der Blüte aufhören. Grundsätzlich für ein aktives Klima sorgen durch Lüften und Ventilation.			